

Departamento de Registro Farmacéutico

**SCEMBLIX®** (asciminib)  
Comprimidos recubiertos 20 mg y 40 mg

## Información básica para la prescripción (CDS)

### Versión 1.6

#### AVISO

La Información básica para la prescripción (CDS, *Core Data Sheet*) de Novartis ilustra la posición actual de la empresa con respecto a características importantes del medicamento, como puede ser la Información básica sobre la seguridad según la ICH E2C.

La CDS de Novartis contiene toda la información necesaria relativa a las indicaciones, la posología, la farmacología y la Información básica sobre la seguridad que Novartis exige que se especifiquen en todos los países en que se haya registrado el producto.

Fecha de entrada en vigor: 5 de mayo de 2023

N.º de referencia (SLC): 2023-PSB/GLC-1355-s

Versión del documento: Última

Propiedad de Novartis

Confidencial

No se usará, divulgará, publicará ni dará a conocer  
sin el consentimiento de Novartis

## 1 Marca comercial

SCEMBLIX® 20 mg y 40 mg, comprimidos recubiertos.

## 2 Descripción y composición

### Forma farmacéutica

- Comprimidos recubiertos de 20 mg: comprimidos recubiertos de color amarillo pálido, redondos, biconvexos, con bordes biselados, de aproximadamente 6,2 mm de diámetro, no ranurados, impresos en relieve hundido con el logotipo de Novartis por un lado y la inscripción «20» por el otro.
- Comprimidos recubiertos de 40 mg: comprimidos recubiertos de color blanco violáceo, redondos, biconvexos, con bordes biselados, de aproximadamente 8,2 mm de diámetro, no ranurados, impresos en relieve hundido con el logotipo de Novartis por un lado y la inscripción «40» por el otro.

### Sustancia activa

Cada comprimido recubierto de 20 mg contiene 21,62 mg de clorhidrato de asciminib, equivalente a 20 mg de asciminib.

Cada comprimido recubierto de 40 mg contiene 43,24 mg de clorhidrato de asciminib, equivalente a 40 mg de asciminib.

### Excipientes

- Comprimidos recubiertos de 20 mg: Lactosa monohidrato, celulosa microcristalina, hiprolosa, croscarmelosa de sodio, estearato de magnesio, dióxido de silicio coloidal, alcohol polivinílico, dióxido de titanio, talco, lecitina, goma xantán, óxido de hierro (amarillo y rojo).
- Comprimidos recubiertos de 40 mg: Lactosa monohidrato, celulosa microcristalina, hiprolosa, croscarmelosa de sodio, estearato de magnesio, dióxido de silicio coloidal, alcohol polivinílico, dióxido de titanio, talco, lecitina, goma xantán, óxido de hierro (negro y rojo).

La información puede diferir en algunos países.

## 3 Indicaciones

Scemblix® está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con:

- Leucemia mieloide crónica con positividad para el cromosoma Filadelfia (LMC Ph+) en fase crónica (FC) tratados previamente con dos o más inhibidores de tirosina-cinasas.

## 4 Posología y administración

El tratamiento con Scemblix debe iniciarlo un médico con experiencia en el uso de terapias antineoplásicas.

## Posología

### Población destinataria general

#### LMC Ph+ FC

La dosis total recomendada de Scemblix es de 80 mg. Se pueden tomar 80 mg de Scemblix por vía oral una vez al día, aproximadamente a la misma hora del día, o bien 40 mg dos veces al día en intervalos de 12 horas aproximadamente.

Los pacientes que pasen de recibir 40 mg dos veces al día a 80 mg una vez al día deberán empezar tomando Scemblix una vez al día, aproximadamente 12 horas después de la última dosis tomada según la pauta de dos veces al día, y continuar con 80 mg una vez al día.

Los pacientes que pasen de recibir 80 mg una vez al día a 40 mg dos veces al día deberán empezar tomando Scemblix dos veces al día, aproximadamente 24 horas después de la última dosis tomada según la pauta de una vez al día, y continuar con 40 mg dos veces al día a intervalos de 12 horas aproximadamente.

Cualquier cambio en la pauta posológica se realizará a criterio del prescriptor, según sea necesario para el tratamiento del paciente.

El tratamiento con Scemblix debe continuar mientras se observe un beneficio clínico o hasta que se presenten signos de toxicidad inaceptable.

#### Omisión de dosis

**Pauta posológica una vez al día:** si se omite una dosis de Scemblix y han transcurrido más de 12 horas aproximadamente con respecto a la hora prevista, deberá saltarse esa dosis y tomarse la siguiente dosis según la pauta habitual.

**Pauta posológica dos veces al día:** si se omite una dosis de Scemblix y han transcurrido más de 6 horas aproximadamente con respecto a la hora prevista, deberá saltarse esa dosis y tomarse la siguiente dosis según la pauta habitual.

### Modificaciones de la dosis

#### LMC Ph+ FC

Con objeto de controlar las reacciones adversas, la dosis de Scemblix se puede reducir en función de la toxicidad y la tolerabilidad individuales, según se describe en la Tabla 4-1. Si las reacciones adversas se consiguen controlar de manera eficaz, se puede reanudar la administración de Scemblix según se describe en la Tabla 4-1.

La administración de Scemblix deberá suspenderse definitivamente en los pacientes que no sean capaces de tolerar una dosis diaria total de 40 mg.

**Tabla 4-1**      **Modificaciones de la dosis de Scemblix**

| Dosis inicial          | Dosis reducida         | Dosis tras la reanudación |
|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 80 mg una vez al día   | 40 mg una vez al día   | 80 mg una vez al día      |
| 40 mg dos veces al día | 20 mg dos veces al día | 40 mg dos veces al día    |

Las modificaciones recomendadas de la dosis para el control de las reacciones adversas de interés se presentan en la Tabla 4-2.

**Tabla 4-2 Modificación de la dosis de Scemblix para el control de las reacciones adversas de interés**

| Reacción adversa                                                                       | Modificaciones de la dosis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trombocitopenia y/o neutropenia</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAN <sup>1</sup> <1 × 10 <sup>9</sup> /l y/o PLQ <sup>2</sup> <50 × 10 <sup>9</sup> /l | <p>Suspender la administración de Scemblix hasta la resolución con una CAN ≥1 × 10<sup>9</sup>/l y/o PLQ ≥50 × 10<sup>9</sup>/l.</p> <p>Si se resuelve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En un plazo de 2 semanas: reanudar Scemblix a la dosis inicial.</li> <li>Después de más de 2 semanas: reanudar Scemblix a una dosis reducida.</li> </ul> <p>En caso de trombocitopenia y/o neutropenia severa, suspender la administración de Scemblix hasta la resolución con una CAN ≥1 × 10<sup>9</sup>/l y PLQ ≥50 × 10<sup>9</sup>/l, y después reanudar a una dosis reducida.</p> |
| <b>Elevación asintomática de la amilasa y/o lipasa</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Elevación >2 veces el LSN <sup>3</sup>                                                 | <p>Suspender la administración de Scemblix hasta la resolución con un valor &lt;1,5 veces el LSN.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si se resuelve: reanudar Scemblix a una dosis reducida. Si las reacciones reaparecen con la dosis reducida, suspender definitivamente la administración de Scemblix.</li> <li>Si no se resuelve: suspender definitivamente la administración de Scemblix. Realizar pruebas diagnósticas para descartar pancreatitis.</li> </ul>                                                                                                               |
| <b>Reacciones adversas no hematológicas</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reacciones moderadas o severas de trascendencia clínica                                | <p>Suspender la administración de Scemblix hasta la resolución.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si se resuelve: reanudar Scemblix a una dosis reducida.</li> <li>Si no se resuelve: suspender definitivamente la administración de Scemblix.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

<sup>1</sup>CAN: cifra absoluta de neutrófilos; <sup>2</sup>PLQ: plaquetas; <sup>3</sup>LSN: límite superior de la normalidad.

## Poblaciones especiales

### Disfunción renal

No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con disfunción renal leve, moderada o severa que reciben Scemblix. (véase el apartado 11 Farmacología clínica).

### Disfunción hepática

No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con disfunción hepática leve, moderada o severa que reciben Scemblix. (véase el apartado 11 Farmacología clínica).

### Pacientes pediátricos (menores de 18 años)

No se ha establecido la seguridad ni la eficacia de Scemblix en pacientes pediátricos (menores de 18 años).

## **Pacientes geriátricos (mayores de 65 años)**

No es preciso ajustar la dosis en pacientes de 65 años o más.

## **Modo de administración**

Scemblix debe tomarse por vía oral sin alimentos. Debe evitarse la ingesta de alimentos durante al menos 2 horas antes y 1 hora después de tomar Scemblix (véanse los apartados 8 Interacciones y 11 Farmacología clínica).

Los comprimidos recubiertos de Scemblix deben tragarse enteros y no deben partirse, triturarse ni masticarse.

## **5       Contraindicaciones**

Ninguna.

## **6       Advertencias y precauciones**

### **Mielosupresión**

Se ha descrito trombocitopenia, neutropenia y anemia en pacientes tratados con Scemblix. Se notificaron trombocitopenia y neutropenia severas (de grado 3 o 4 de los CTCAE) durante el tratamiento con Scemblix (véase el apartado 7 Reacciones adversas). Por lo general, la mielosupresión fue reversible y controlable mediante la suspensión provisional de la administración de Scemblix. Se deben realizar hemogramas completos cada 2 semanas durante los 3 primeros meses de tratamiento y, posteriormente, cada mes o cuando esté clínicamente indicado. Se debe vigilar atentamente a los pacientes para detectar signos y síntomas de mielosupresión.

En función de la severidad de la trombocitopenia y/o neutropenia, se deberá reducir la dosis o interrumpir de manera temporal o definitiva la administración de Scemblix, según se describe en la Tabla 4-2 (véase el apartado 4 Posología y administración).

### **Toxicidad pancreática**

Se produjo pancreatitis en 9 de los 356 (2,5%) pacientes que recibieron Scemblix, y 4 (1,1%) pacientes presentaron reacciones de grado 3. Todas estas reacciones se registraron en el estudio de fase I (X2101). De los 9 pacientes con pancreatitis, 2 (0,6%) suspendieron definitivamente el tratamiento con Scemblix, mientras que en 4 (1,1%) pacientes se interrumpió de manera temporal la administración de Scemblix debido a la reacción adversa. Se produjo una elevación asintomática de los valores séricos de lipasa y amilasa en 76 de los 356 (21,3%) pacientes que recibieron Scemblix; esta reacción fue de grado 3 en 36 pacientes (10,1%) y de grado 4 en 8 (2,2%). De los 76 pacientes con elevación de las enzimas pancreáticas, en 8 (2,2%) pacientes se suspendió definitivamente la administración de Scemblix debido a la reacción adversa.

Las concentraciones séricas de lipasa y amilasa deben evaluarse cada mes durante el tratamiento con Scemblix, o cuando esté clínicamente indicado. Se debe vigilar atentamente a los pacientes para detectar signos y síntomas de toxicidad pancreática. En los pacientes con antecedentes de

pancreatitis deben realizarse controles más frecuentes. Si la elevación de las concentraciones séricas de lipasa y amilasa se acompaña de síntomas abdominales, el tratamiento deberá interrumpirse de manera temporal y se valorará la realización de las pruebas diagnósticas pertinentes para descartar una pancreatitis (véase el apartado 4 Posología y administración).

En función de la severidad de la elevación de las concentraciones séricas de lipasa y amilasa, se deberá reducir la dosis o interrumpir de manera temporal o definitiva la administración de Scemblix, según se describe en la Tabla 4-2 (véase el apartado 4 Posología y administración).

### **Prolongación del intervalo QT**

El intervalo QT prolongado en el electrocardiograma se produjo en 3 de los 356 (0,8%) pacientes que recibieron Scemblix (véase el apartado 7 Reacciones adversas). En el estudio clínico ASCSEMBL, un paciente presentó un intervalo QT corregido con la fórmula de Fridericia (QTcF) prolongado superior a 500 ms, con un aumento del QTcF superior a 60 ms con respecto al valor inicial, y un paciente presentó un intervalo QTcF prolongado con un aumento del QTcF superior a 60 ms con respecto al valor inicial.

Se recomienda realizar un electrocardiograma antes de iniciar el tratamiento con Scemblix y mantener la vigilancia durante el tratamiento según esté clínicamente indicado. La hipopotasemia y la hipomagnesemia deben corregirse antes de administrar Scemblix y la vigilancia debe mantenerse durante el tratamiento según esté clínicamente indicado.

Se debe tener precaución al administrar Scemblix a una dosis diaria total de 80 mg junto con medicamentos que se sabe que producen taquicardia helicoidal (*torsade de pointes*). (véanse los apartados 8 Interacciones y 11 Farmacología clínica).

### **Hipertensión arterial**

Se produjo hipertensión en 66 de los 356 (18,5%) pacientes que recibieron Scemblix; esta reacción fue de grado 3 en 30 pacientes (8,4%) y de grado 4 en 1 (0,3%). Entre los pacientes con hipertensión de grado  $\geq 3$ , la mediana del tiempo transcurrido hasta el primer episodio de la reacción fue de 14 semanas (intervalo: de 0,1 a 156 semanas). De los 66 pacientes con hipertensión, en 3 (0,8%) pacientes se interrumpió de manera temporal la administración de Scemblix debido a la reacción adversa.

La hipertensión debe vigilarse y controlarse con antihipertensores habituales durante el tratamiento con Scemblix, según esté clínicamente indicado.

### **Hipersensibilidad**

Se produjeron eventos de hipersensibilidad en 111 de los 356 (31,2%) pacientes que recibieron Scemblix, y en 6 (1,7%) de estos pacientes se notificaron eventos de grado  $\geq 3$ . Se debe vigilar a los pacientes para detectar signos y síntomas de hipersensibilidad e instaurar el tratamiento adecuado, según esté clínicamente indicado.

### **Reactivación de la hepatitis B**

Se ha descrito la reactivación del virus de la hepatitis B (VHB) en pacientes portadores crónicos del virus tras la administración de otros inhibidores de tirosina-cinasas (ITC) BCR-ABL1. Los

pacientes deben someterse a pruebas de detección de la infección por el VHB antes de iniciar el tratamiento con Scemblix. Se debe vigilar atentamente a los portadores del VHB que precisen tratamiento con Scemblix a fin de detectar los signos y síntomas de infección activa por VHB durante todo el tratamiento y hasta varios meses después de haberlo finalizado.

### **Toxicidad embriofetal**

Los resultados de los estudios con animales indican que Scemblix puede ser dañino para el feto cuando se administra a una embarazada. Se debe advertir a las embarazadas y a las mujeres con capacidad de procrear del posible riesgo para el feto en caso de que se utilice Scemblix durante el embarazo o de que la paciente se quede embarazada mientras recibe Scemblix. Se hará una prueba de embarazo a las mujeres con capacidad de procrear antes de empezar el tratamiento con Scemblix. Las mujeres sexualmente activas y con capacidad de procrear deberán utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con Scemblix y hasta al menos 3 días después de la última dosis (véase el apartado 9 Embarazo, lactancia, mujeres y varones con capacidad de procrear).

## **7 Reacciones adversas**

### **Resumen del perfil toxicológico**

El perfil toxicológico global de Scemblix se ha evaluado en 356 pacientes con LMC Ph+ en fase crónica (FC) y acelerada (FA) que recibieron Scemblix en monoterapia. Se basa en la población de seguridad del estudio pivotal de fase III A2301 (ASCEMBL) ( $N = 156$  pacientes con LMC Ph+ FC) y en el estudio de fase I X2101, en el que participaron pacientes con:

- LMC Ph+ FC ( $N = 115$ )
- LMC Ph+ FC portadores de la mutación T315I ( $N = 70$ )
- LMC Ph+ FA ( $N = 15$ )

La población de seguridad ( $N = 356$ ) incluye pacientes tratados con Scemblix en dosis comprendidas entre 10 y 200 mg dos veces al día y entre 80 y 200 mg una vez al día. En el conjunto de datos agrupados, la mediana de duración de la exposición a Scemblix fue de 116 semanas (intervalo: de 0,1 a 342 semanas).

Las reacciones adversas más frecuentes de cualquier grado (incidencia  $\geq 20\%$ ) entre los pacientes que recibieron Scemblix fueron dolor musculoesquelético (37,1%), infecciones de las vías respiratorias altas (28,1%), trombocitopenia (27,5%), fatiga (27,2%), cefalea (24,2%), artralgia (21,6%), enzimas pancreáticas elevadas (21,3%), dolor abdominal (21,3%), diarrea (20,5%) y náuseas (20,2%). Las reacciones adversas de grado  $\geq 3$  más frecuentes (incidencia  $\geq 5\%$ ) entre los pacientes que recibieron Scemblix fueron trombocitopenia (18,5%), neutropenia (15,7%), enzimas pancreáticas elevadas (12,4%), hipertensión (8,7%) y anemia (5,3%).

Se produjeron reacciones adversas graves en el 12,4% de los pacientes que recibieron Scemblix. Las reacciones adversas graves más frecuentes (incidencia  $\geq 1\%$ ) fueron derrame pleural (2,5%), infecciones de las vías respiratorias bajas (2,2%), trombocitopenia (1,7%), pirexia (1,4%), pancreatitis (1,1%), dolor torácico no cardíaco (1,1%) y vómitos (1,1%).

El perfil toxicológico previsto de Scemblix a la dosis de 80 mg una vez al día es similar al observado con la dosis de 40 mg dos veces al día, a juzgar por el análisis de la seguridad según la exposición.

### Resumen tabulado de las reacciones adversas procedentes de ensayos clínicos

Las reacciones adversas procedentes de los estudios clínicos (Tabla 7-1) se enumeran por clase de órgano, aparato o sistema del MedDRA. Dentro de cada clase de órgano, aparato o sistema, las reacciones adversas se clasifican por orden decreciente de frecuencia. Dentro de cada grupo de frecuencia, las reacciones adversas se presentan por orden decreciente de gravedad. También se indica la categoría de frecuencia de cada reacción adversa aplicando la siguiente convención (CIOMS III): muy frecuentes ( $\geq 1/10$ ); frecuentes ( $\geq 1/100$  a  $< 1/10$ ); infrecuentes ( $\geq 1/1000$  a  $< 1/100$ ); raras ( $\geq 1/10\,000$  a  $< 1/1000$ ); muy raras ( $< 1/10\,000$ ).

**Tabla 7-1 Reacciones adversas observadas con Scemblix en los estudios clínicos**

| Reacciones adversas                                    | Scemblix<br>40 mg dos<br>veces por día<br>(2×d) <sup>1</sup><br>N = 156,<br>n (%)<br>Todos los<br>grados | Bosutinib<br>500 mg una<br>vez por día<br>(1×d) <sup>2</sup><br>N = 76,<br>n (%)<br>Todos los<br>grados | Scemblix<br>40 mg 2×d <sup>1</sup><br>N = 156,<br>n (%)<br>Grado $\geq 3$ | Bosutinib<br>500 mg 1×d <sup>2</sup><br>N = 76,<br>n (%)<br>Grado $\geq 3$ | Scemblix<br>población<br>de<br>seguridad <sup>3</sup><br>N = 356 (%)<br>Todos los<br>grados | Categoría de<br>frecuencia <sup>3</sup><br>N = 356<br>Todos los grados |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Infecciones e infestaciones</b>                     |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                           |                                                                            |                                                                                             |                                                                        |
| Infección de las vías respiratorias altas <sup>4</sup> | 38 (24,4)                                                                                                | 7 (9,2)                                                                                                 | 1 (0,6)                                                                   | 0                                                                          | 100 (28,1)                                                                                  | Muy frecuente                                                          |
| Infección de las vías respiratorias bajas <sup>5</sup> | 6 (3,8)                                                                                                  | 2 (2,6)                                                                                                 | 1 (0,6)                                                                   | 0                                                                          | 26 (7,3)                                                                                    | Frecuente                                                              |
| Gripe                                                  | 5 (3,2)                                                                                                  | 2 (2,6)                                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                          | 15 (4,2)                                                                                    | Frecuente                                                              |
| <b>Trastornos de la sangre y del sistema linfático</b> |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                           |                                                                            |                                                                                             |                                                                        |
| Trombocitopenia <sup>6</sup>                           | 46 (29,5)                                                                                                | 15 (19,7)                                                                                               | 35 (22,4)                                                                 | 7 (9,2)                                                                    | 98 (27,5)                                                                                   | Muy frecuente                                                          |
| Neutropenia <sup>7</sup>                               | 36 (23,1)                                                                                                | 16 (21,1)                                                                                               | 29 (18,6)                                                                 | 11 (14,5)                                                                  | 69 (19,4)                                                                                   | Muy frecuente                                                          |
| Anemia <sup>8</sup>                                    | 16 (10,3)                                                                                                | 7 (9,2)                                                                                                 | 2 (1,3)                                                                   | 3 (3,9)                                                                    | 46 (12,9)                                                                                   | Muy frecuente                                                          |
| Neutropenia febril                                     | 1 (0,6)                                                                                                  | 0                                                                                                       | 1 (0,6)                                                                   | 0                                                                          | 3 (0,8)                                                                                     | Infrecuente                                                            |
| <b>Trastornos del sistema inmunitario</b>              |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                           |                                                                            |                                                                                             |                                                                        |
| Hipersensibilidad                                      | 0                                                                                                        | 1 (0,3)                                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                          | 1 (0,3)                                                                                     | Infrecuente                                                            |



| Reacciones adversas                                        | Scemblix<br>40 mg dos<br>veces por día<br>(2×d) <sup>1</sup><br>N = 156,<br>n (%)<br>Todos los<br>grados | Bosutinib<br>500 mg una<br>vez por día<br>(1×d) <sup>2</sup><br>N = 76,<br>n (%)<br>Todos los<br>grados | Scemblix<br>40 mg 2×d <sup>1</sup><br>N = 156,<br>n (%)<br>Grado ≥3 | Bosutinib<br>500 mg 1×d <sup>2</sup><br>N = 76,<br>n (%)<br>Grado ≥3 | Scemblix<br>población<br>de<br>seguridad <sup>3</sup><br>N = 356 (%)<br>Todos los<br>grados | Categoría de<br>frecuencia <sup>3</sup><br>N = 356<br>Todos los grados |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trastornos del metabolismo y de la nutrición</b>        |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                     |                                                                      |                                                                                             |                                                                        |
| Dislipidemia <sup>9</sup>                                  | 9 (5,8)                                                                                                  | 2 (2,6)                                                                                                 | 4 (2,6)                                                             | 0                                                                    | 37 (10,4)                                                                                   | Muy frecuente                                                          |
| Apetito disminuido                                         | 8 (5,1)                                                                                                  | 6 (7,9)                                                                                                 | 0                                                                   | 0                                                                    | 25 (7)                                                                                      | Frecuente                                                              |
| <b>Trastornos del sistema nervioso</b>                     |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                     |                                                                      |                                                                                             |                                                                        |
| Cefalea                                                    | 31 (19,9)                                                                                                | 12 (15,8)                                                                                               | 3 (1,9)                                                             | 0                                                                    | 86 (24,2)                                                                                   | Muy frecuente                                                          |
| Mareo                                                      | 11 (7,1)                                                                                                 | 2 (2,6)                                                                                                 | 0                                                                   | 0                                                                    | 40 (11,2)                                                                                   | Muy frecuente                                                          |
| <b>Trastornos oculares</b>                                 |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                     |                                                                      |                                                                                             |                                                                        |
| Visión borrosa                                             | 4 (2,6)                                                                                                  | 0                                                                                                       | 0                                                                   | 0                                                                    | 17 (4,8)                                                                                    | Frecuente                                                              |
| Ojo seco                                                   | 3 (1,9)                                                                                                  | 2 (2,6)                                                                                                 | 0                                                                   | 0                                                                    | 19 (5,3)                                                                                    | Frecuente                                                              |
| <b>Trastornos cardíacos</b>                                |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                     |                                                                      |                                                                                             |                                                                        |
| Palpitaciones                                              | 4 (2,6)                                                                                                  | 0                                                                                                       | 0                                                                   | 0                                                                    | 15 (4,2)                                                                                    | Frecuente                                                              |
| <b>Trastornos vasculares</b>                               |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                     |                                                                      |                                                                                             |                                                                        |
| Hipertensión arterial <sup>10</sup>                        | 21 (13,5)                                                                                                | 4 (5,3)                                                                                                 | 10 (6,4)                                                            | 3 (3,9)                                                              | 66 (18,5)                                                                                   | Muy frecuente                                                          |
| <b>Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos</b> |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                     |                                                                      |                                                                                             |                                                                        |
| Tos                                                        | 13 (8,3)                                                                                                 | 5 (6,6)                                                                                                 | 0                                                                   | 0                                                                    | 45 (12,6)                                                                                   | Muy frecuente                                                          |
| Derrame pleural                                            | 2 (1,3)                                                                                                  | 3 (3,9)                                                                                                 | 0                                                                   | 2 (2,6)                                                              | 16 (4,5)                                                                                    | Frecuente                                                              |
| Disnea                                                     | 8 (5,1)                                                                                                  | 4 (5,3)                                                                                                 | 0                                                                   | 0                                                                    | 33 (9,3)                                                                                    | Frecuente                                                              |
| Dolor torácico no<br>cardíaco                              | 8 (5,1)                                                                                                  | 1 (1,3)                                                                                                 | 2 (1,3)                                                             | 0                                                                    | 26 (7,3)                                                                                    | Frecuente                                                              |
| <b>Trastornos gastrointestinales</b>                       |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                     |                                                                      |                                                                                             |                                                                        |
| Enzimas pancreáticas<br>elevadas <sup>11</sup>             | 13 (8,3)                                                                                                 | 7 (9,2)                                                                                                 | 6 (3,8)                                                             | 4 (5,3)                                                              | 76 (21,3)                                                                                   | Muy frecuente                                                          |

| Reacciones adversas           | Scemblix<br>40 mg dos<br>veces por día<br>(2×d) <sup>1</sup><br>N = 156,<br>n (%)<br>Todos los<br>grados | Bosutinib<br>500 mg una<br>vez por día<br>(1×d) <sup>2</sup><br>N = 76,<br>n (%)<br>Todos los<br>grados | Scemblix<br>40 mg 2×d <sup>1</sup><br>N = 156,<br>n (%)<br>Grado ≥3 | Bosutinib<br>500 mg 1×d <sup>2</sup><br>N = 76,<br>n (%)<br>Grado ≥3 | Scemblix<br>población<br>de<br>seguridad <sup>3</sup><br>N = 356 (%)<br>Todos los<br>grados | Categoría de<br>frecuencia <sup>3</sup><br>N = 356<br>Todos los grados |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Vómitos                       | 12 (7,7)                                                                                                 | 20 (26,3)                                                                                               | 2 (1,3)                                                             | 0                                                                    | 56 (15,7)                                                                                   | Muy frecuente                                                          |
| Diarrea                       | 20 (12,8)                                                                                                | 55 (72,4)                                                                                               | 0                                                                   | 8 (10,5)                                                             | 73 (20,5)                                                                                   | Muy frecuente                                                          |
| Náuseas                       | 18 (11,5)                                                                                                | 35 (46,1)                                                                                               | 1 (0,6)                                                             | 0                                                                    | 72 (20,2)                                                                                   | Muy frecuente                                                          |
| Dolor abdominal <sup>12</sup> | 20 (12,8)                                                                                                | 17 (22,4)                                                                                               | 0                                                                   | 2 (2,6)                                                              | 76 (21,3)                                                                                   | Muy frecuente                                                          |
| Pancreatitis <sup>13</sup>    | 0                                                                                                        | 0                                                                                                       | 0                                                                   | 0                                                                    | 9 (2,5)                                                                                     | Frecuente                                                              |

**Trastornos hepato biliares**

|                                                |          |           |         |           |           |               |
|------------------------------------------------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|
| Enzima hepática<br>elevada <sup>14</sup>       | 11 (7,1) | 25 (32,9) | 3 (1,9) | 13 (17,1) | 52 (14,6) | Muy frecuente |
| Bilirrubina en sangre<br>elevada <sup>15</sup> | 4 (2,6)  | 1 (1,3)   | 0       | 0         | 14 (3,9)  | Frecuente     |

**Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo**

|                        |           |         |   |         |           |               |
|------------------------|-----------|---------|---|---------|-----------|---------------|
| Erupción <sup>16</sup> | 22 (14,1) | 19 (25) | 0 | 4 (5,3) | 70 (19,7) | Muy frecuente |
| Urticaria              | 2 (1,3)   | 2 (2,6) | 0 | 0       | 12 (3,4)  | Frecuente     |

**Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo**

|                                           |           |           |         |         |            |               |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|------------|---------------|
| Dolor<br>musculoesquelético <sup>17</sup> | 32 (20,5) | 12 (15,8) | 2 (1,3) | 1 (1,3) | 132 (37,1) | Muy frecuente |
| Artralgia                                 | 20 (12,8) | 3 (3,9)   | 1 (0,6) | 0       | 77 (21,6)  | Muy frecuente |

**Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración**

|                         |           |          |         |         |           |               |
|-------------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|
| Cansancio <sup>18</sup> | 31 (19,9) | 8 (10,5) | 1 (0,6) | 1 (1,3) | 97 (27,2) | Muy frecuente |
| Prurito                 | 8 (5,1)   | 5 (6,6)  | 0       | 1 (1,3) | 44 (12,4) | Muy frecuente |
| Fiebre <sup>19</sup>    | 6 (3,8)   | 7 (9,2)  | 2 (1,3) | 1 (1,3) | 33 (9,3)  | Frecuente     |
| Edema <sup>20</sup>     | 12 (7,7)  | 2 (2,6)  | 0       | 0       | 35 (9,8)  | Frecuente     |

**Exploraciones complementarias**

| Reacciones adversas                                 | Scemblix<br>40 mg dos<br>veces por día<br>(2×d) <sup>1</sup><br>N = 156,<br>n (%)<br>Todos los<br>grados | Bosutinib<br>500 mg una<br>vez por día<br>(1×d) <sup>2</sup><br>N = 76,<br>n (%)<br>Todos los<br>grados | Scemblix<br>40 mg 2×d <sup>1</sup><br>N = 156,<br>n (%)<br>Grado ≥3 | Bosutinib<br>500 mg 1×d <sup>2</sup><br>N = 76,<br>n (%)<br>Grado ≥3 | Scemblix<br>población<br>de<br>seguridad <sup>3</sup><br>N = 356 (%)<br>Todos los<br>grados | Categoría de<br>frecuencia <sup>3</sup><br>N = 356<br>Todos los grados |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Creatina-fosfocinasa<br>elevada en sangre           | 4 (2,6)                                                                                                  | 3 (3,9)                                                                                                 | 3 (1,9)                                                             | 1 (1,3)                                                              | 13 (3,7)                                                                                    | Frecuente                                                              |
| Intervalo QT prolongado<br>en el electrocardiograma | 2 (1,3)                                                                                                  | 0                                                                                                       | 1 (0,6)                                                             | 0                                                                    | 3 (0,8)                                                                                     | Infrecuente                                                            |

<sup>1</sup>Mediana de duración de la exposición a Scemblix: 103 semanas (intervalo: de 0,1 a 201 semanas); el 53,5% de los pacientes siguen en tratamiento.

<sup>2</sup>Mediana de duración de la exposición al bosutinib: 31 semanas (intervalo: de 1 a 188 semanas); el 19,7% de los pacientes siguen en tratamiento.

<sup>3</sup>Frecuencia basada en la población de seguridad (A2301 y X2101) para las reacciones de cualquier grado notificadas con Scemblix (N = 356).

<sup>4</sup>El término «infección de las vías respiratorias altas» incluye: infección respiratoria de las vías altas, nasofaringitis, faringitis y rinitis; <sup>5</sup>el término «infección de las vías respiratorias bajas» incluye: neumonía, bronquitis y traqueobronquitis; <sup>6</sup>el término «trombocitopenia» incluye: trombocitopenia y recuento de plaquetas disminuido; <sup>7</sup>el término «neutropenia» incluye: neutropenia y recuento de neutrófilos disminuido; <sup>8</sup>el término «anemia» incluye: anemia, hemoglobina disminuida y anemia normocítica.

<sup>9</sup>El término «dislipidemia» incluye: hipertrigliceridemia, colesterol en sangre elevado, hipercolesterolemia, triglicéridos en sangre elevados, hiperlipidemia y dislipidemia; <sup>10</sup>el término «hipertensión arterial» incluye: hipertensión y tensión arterial aumentada; <sup>11</sup>el término «enzimas pancreáticas elevadas» incluye: lipasa elevada, amilasa elevada e hiperlipasemia; <sup>12</sup>el término «dolor abdominal» incluye: dolor abdominal y dolor en la zona superior del abdomen; <sup>13</sup>el término «pancreatitis» incluye: pancreatitis y pancreatitis aguda.

<sup>14</sup>El término «enzimas hepáticas elevadas» incluye: alanina-aminotransferasa elevada, aspartato-aminotransferasa elevada, γ-glutamilttransferasa elevada y transaminasas elevadas; <sup>15</sup>el término «bilirrubina en sangre elevada» incluye: bilirrubina en sangre elevada, bilirrubina conjugada elevada e hiperbilirrubinemia; <sup>16</sup>el término «erupción» incluye: erupción y erupción maculopapular; <sup>17</sup>El término «dolor musculoesquelético» incluye: dolor en una extremidad, dolor de espalda, mialgia, dolor óseo, dolor musculoesquelético, dolor de cuello, dolor torácico musculoesquelético y molestias musculoesqueléticas; <sup>18</sup>el término «cansancio» incluye: fatiga y astenia; <sup>19</sup>el término «fiebre» incluye: piroxia y temperatura corporal elevada; <sup>20</sup>el término «edema» incluye: edema y edema periférico.

Una anomalía en las pruebas de laboratorio consistente en la disminución de la concentración de fosfato se produjo en el 17,9% (cualquier grado) y en el 6,4% (grado 3 o 4) de los 156 pacientes que recibieron Scemblix en dosis de 40 mg dos veces al día.

## Descripción de reacciones adversas de interés

### Mielosupresión

Se produjo trombocitopenia en 98 de los 356 (27,5%) pacientes que recibieron Scemblix; esta reacción fue de grado 3 en 24 pacientes (6,7%) y de grado 4 en 42 (11,8%). Entre los pacientes con trombocitopenia de grado ≥3, la mediana del tiempo transcurrido hasta el primer episodio de la reacción fue de 6 semanas (intervalo: de 0,1 a 64 semanas) y la mediana de duración de cualquier reacción fue de 1,71 semanas (IC del 95%: de 1,43 a 2 semanas). De los 98 pacientes con trombocitopenia, 7 (2%) suspendieron definitivamente el tratamiento con Scemblix,

mientras que en 45 (12,6%) pacientes se interrumpió de manera temporal la administración de Scemblix debido a la reacción adversa.

Se produjo neutropenia en 69 de los 356 (19,4%) pacientes que recibieron Scemblix; esta reacción fue de grado 3 y 4 en 26 (7,3%) y 30 (8,4%) pacientes, respectivamente. Entre los pacientes con neutropenia de grado  $\geq 3$ , la mediana del tiempo transcurrido hasta el primer episodio de la reacción fue de 6 semanas (intervalo: de 0,14 a 180 semanas) y la mediana de duración de cualquier reacción fue de 1,79 semanas (IC del 95%: de 1,29 a 2 semanas). De los 69 pacientes con neutropenia, 4 (1,1%) suspendieron definitivamente el tratamiento con Scemblix, mientras que en 34 (9,6%) pacientes se interrumpió de manera temporal la administración de Scemblix debido a la reacción adversa.

Se produjo anemia en 46 de los 356 (12,9%) pacientes que recibieron Scemblix, y 19 (5,3%) de estos pacientes presentaron una reacción de grado 3. Entre los pacientes con anemia de grado  $\geq 3$ , la mediana del tiempo transcurrido hasta el primer episodio de la reacción fue de 30 semanas (intervalo: de 0,4 a 207 semanas) y la mediana de duración de cualquier reacción fue de 0,9 semanas (IC del 95%: de 0,43 a 2,14 semanas). De los 46 pacientes con anemia, en 2 (0,6%) pacientes se interrumpió de manera temporal la administración de Scemblix debido a la reacción adversa.

## 8 Interacciones

### Sustancias que pueden reducir la concentración plasmática de asciminib

#### *Inductores potentes del CYP3A4*

La administración conjunta de un inductor potente del CYP3A4 (rifampicina) redujo el  $AUC_{0-\infty}$  de asciminib en un 14,9% y aumentó la  $C_{m\acute{a}x}$  de asciminib en un 9% en sujetos sanos que recibieron una dosis única de 40 mg de Scemblix.

Los modelos FCF predicen que la administración conjunta de asciminib en dosis de 80 mg una vez al día y rifampicina reduciría el  $AUC_{\tau}$  y la  $C_{m\acute{a}x}$  de asciminib en un 52% y un 23%, respectivamente.

Se debe tener precaución durante la administración conjunta de Scemblix en todas las dosis recomendadas e inductores potentes del CYP3A4, como la carbamazepina, el fenobarbital, la fenitoína o la hierba de san Juan (*Hypericum perforatum*), entre otros. No es preciso ajustar la dosis de Scemblix.

### Sustancias cuyas concentraciones plasmáticas pueden resultar alteradas por el asciminib

#### *Sustratos del CYP3A4 con un estrecho margen terapéutico*

La administración conjunta de asciminib y un sustrato del CYP3A4 (midazolam) aumentó el  $AUC_{0-\infty}$  y la  $C_{m\acute{a}x}$  de midazolam en un 28% y un 11%, respectivamente, en sujetos sanos que recibieron 40 mg de Scemblix dos veces al día.

Los modelos FCF predicen que la administración conjunta de asciminib en dosis de 80 mg una vez al día aumentaría el  $AUC_{0-\infty}$  y la  $C_{m\acute{a}x}$  de midazolam en un 24% y un 17%, respectivamente.

Se debe tener precaución durante la administración conjunta de Scemblix en todas las dosis recomendadas y sustratos del CYP3A4 con un estrecho margen terapéutico, como el fentanilo, el alfentanilo, la dihidroergotamina o la ergotamina, entre otros (véase el apartado 11 Farmacología clínica). No es preciso ajustar la dosis de Scemblix.

### ***Sustratos del CYP2C9***

La administración conjunta de asciminib con un sustrato del CYP2C9 (warfarina) aumentó el  $AUC_{0-\infty}$  y la  $C_{\text{máx}}$  de S-warfarina en un 41% y un 8%, respectivamente, en sujetos sanos que recibieron 40 mg de Scemblix dos veces al día.

Los modelos FCF predicen que la administración conjunta de asciminib en dosis de 80 mg una vez al día aumentaría el  $AUC_{0-\infty}$  y la  $C_{\text{máx}}$  de S-warfarina en un 52% y un 4%, respectivamente.

Se debe tener precaución durante la administración conjunta de Scemblix a una dosis diaria total de 80 mg y sustratos del CYP2C9 con un estrecho margen terapéutico, como la fenitoína o la warfarina (véase el apartado 11 Farmacología clínica). No es preciso ajustar la dosis de Scemblix.

### ***Sustratos del OATP1B, de la BCRP o de ambos transportadores***

Los modelos FCF predicen que la administración conjunta de asciminib en dosis de 40 mg dos veces al día y de 80 mg una vez al día con un sustrato del OATP1B (pravastatina) aumentaría la  $C_{\text{máx}}$  de la pravastatina en un 43% y un 63%, y el  $AUC_{0-\infty}$  en un 37% y un 51%, respectivamente.

Los modelos FCF predicen que la administración conjunta de asciminib en dosis de 40 mg dos veces al día y de 80 mg una vez al día con un sustrato del OATP1B, del CYP3A4 y de la gpP (atorvastatina) aumentaría la  $C_{\text{máx}}$  de la atorvastatina en un 97% y un 143%, y el  $AUC_{0-\infty}$  en un 81% y un 122%, respectivamente.

Los modelos FCF predicen que la administración conjunta de asciminib en dosis de 40 mg dos veces al día y de 80 mg una vez al día con un sustrato de la BCRP (sulfasalazina) aumentaría la  $C_{\text{máx}}$  de la sulfasalazina en un 334% y un 342%, y el  $AUC_{0-\infty}$  en un 333% y un 340%, respectivamente.

Los modelos FCF predicen que la administración conjunta de asciminib en dosis de 40 mg dos veces al día y de 80 mg una vez al día con un sustrato de la BCRP y del OATP1B (rosuvastatina) aumentaría la  $C_{\text{máx}}$  de la rosuvastatina en un 453% y un 530%, y el  $AUC_{0-\infty}$  en un 190% y un 202%, respectivamente.

Se debe tener precaución durante la administración concomitante de Scemblix en todas las dosis recomendadas con sustratos del OATP1B, la BCRP o ambos transportadores, incluidos, entre otros, la sulfasalazina, el metotrexato, la pravastatina, la atorvastatina, la pitavastatina, la rosuvastatina y la simvastatina. Considérense las reducciones de la dosis de los sustratos del OATP1B y la BCRP, según lo recomendado en su información para la prescripción.

Se debe evitar la administración conjunta de Scemblix en todas las dosis recomendadas con rosuvastatina y se deben considerar estatinas alternativas. Si no pudiera evitarse la administración conjunta, se reducirá la dosis de rosuvastatina, según lo recomendado en su información para la prescripción (véase el apartado 11 Farmacología clínica).

## **Sustancias que prolongan el intervalo QT**

Se debe tener precaución durante la administración conjunta de Scemblix a una dosis diaria total de 80 mg y medicamentos que provocan taquicardia helicoidal, como el bepridil, la cloroquina, la claritromicina, la halofantrina, el haloperidol, la metadona, el moxifloxacino o la pimozida, entre otros (véase el apartado 11 Farmacología clínica).

## **Interacciones con alimentos**

La biodisponibilidad del asciminib disminuye con la ingesta de alimentos (véanse los apartados 4 Posología y administración y 11 Farmacología clínica).

## **9 Embarazo, lactancia, mujeres y varones con capacidad de procrear**

### **9.1 Embarazo**

#### **Resumen de los riesgos**

De acuerdo con los resultados de los estudios realizados en animales, Scemblix puede causar daños fetales si se administra a embarazadas. No se han realizado estudios comparativos adecuados en embarazadas que fundamenten el riesgo asociado al producto.

Los estudios sobre reproducción animal realizados con ratas y conejas gestantes demostraron que la administración oral de asciminib durante la organogénesis inducía embriotoxicidad, fetotoxicidad y teratogenia.

Se debe advertir a las embarazadas y a las mujeres con capacidad de procrear del posible riesgo para el feto en caso de que se utilice Scemblix durante el embarazo o de que la paciente se quede embarazada mientras recibe Scemblix (véase el apartado 6 Advertencias y precauciones).

#### **Datos**

##### **Datos en animales**

En los estudios de desarrollo embriofetal, se administraron dosis de 25, 150 y 600 mg/kg/d de asciminib por vía oral a ratas gestantes y de 15, 50 y 300 mg/kg/d a conejas gestantes durante el período de organogénesis.

Las ratas gestantes no toleraron el asciminib en dosis de 600 mg/kg/d, lo que condujo a la finalización anticipada de este grupo de dosis. No se observaron indicios de muerte embriofetal relacionada con el asciminib en dosis de hasta 150 mg/kg/d. Se observó un aumento del peso fetal relacionado con las dosis de 25 y 150 mg/kg/d. Se observaron variaciones fetales en el aparato urinario y en el esqueleto (cráneo, columna vertebral y costillas), indicativas de cambios en la velocidad de desarrollo, principalmente con la dosis de 150 mg/kg/d. Con la dosis de 150 mg/kg/d también se observó un ligero aumento de la tasa de malformaciones (anasarca y malformaciones cardíacas) y algunas variantes viscerales indicativas de efectos adversos sobre el desarrollo embriofetal. La dosis máxima sin efecto observado (NOAEL) fue de 150 mg/kg/d para las madres y de 25 mg/kg/d para los fetos. Con la NOAEL fetal de 25 mg/kg/d, la

exposición (AUC) fue equivalente o inferior a la alcanzada en pacientes que recibieron las dosis de 40 mg dos veces al día o de 80 mg una vez al día, respectivamente.

La dosis de 300 mg/kg/d produjo morbilidad en las conejas gestantes y dio lugar a la finalización anticipada de ese grupo de dosis. Con la dosis de 50 mg/kg/d se observó un aumento de la incidencia de resorciones, indicativas de mortalidad embrionofetal, y una incidencia baja de malformaciones cardíacas, indicativas de teratogenia. No se observaron efectos sobre el crecimiento fetal. La NOAEL fue de 50 mg/kg/d para las madres y de 15 mg/kg/d para los fetos. Con la NOAEL fetal de 15 mg/kg/d, la exposición (AUC) fue equivalente o inferior a la alcanzada en pacientes que recibieron las dosis de 40 mg dos veces al día o de 80 mg una vez al día, respectivamente.

## **9.2 Lactancia**

### **Resumen de los riesgos**

Se desconoce si el asciminib pasa a la leche humana tras la administración de Scemblix. No hay datos acerca de los efectos del asciminib en lactantes amamantados ni en la producción de leche.

Debido a la posibilidad de reacciones adversas graves en los lactantes amamantados, no se recomienda la lactancia durante el tratamiento con Scemblix y hasta al menos 3 días después de la última dosis.

## **9.3 Mujeres y varones con capacidad de procrear**

### **Prueba del embarazo**

Se hará una prueba de embarazo a las mujeres con capacidad de procrear antes de empezar el tratamiento con Scemblix.

### **Anticoncepción**

Las mujeres sexualmente activas y con capacidad de procrear deberán utilizar un método anticonceptivo eficaz (con una tasa de embarazos inferior al 1%) durante el tratamiento con Scemblix y hasta al menos 3 días después de la última dosis.

### **Esterilidad**

No hay datos acerca del efecto de Scemblix en la fertilidad humana.

En el estudio de fecundidad en ratas, el asciminib no afectó la función reproductora de las ratas de ambos sexos. Se observó un pequeño efecto en la motilidad y el número de los espermatozoides con dosis de 200 mg/kg/d, con valores probables de exposición (AUC) 19 y 13 mayores que los alcanzados en los pacientes con las dosis de 40 mg dos veces al día y 80 mg una vez al día respectivamente.

## **10 Sobredosis**

La experiencia respecto a sobredosis de Scemblix es escasa. En los estudios clínicos, Scemblix se ha administrado en dosis de hasta 280 mg dos veces al día, sin que se observasen indicios de

aumento de la toxicidad. En caso de sospecha de sobredosis, deberán instaurarse medidas generales de apoyo y sintomáticas.

## 11 Farmacología clínica

### Grupo farmacoterapéutico, ATC

Grupo farmacoterapéutico: antineoplásicos. Código ATC: L01EA06

### Mecanismo de acción

El asciminib es un potente inhibidor de la tirosina-cinasa ABL/BCR-ABL1 que se administra por vía oral. El asciminib inhibe la actividad cinasa de ABL1 de la proteína de fusión BCR-ABL1, ya que se dirige específicamente al sitio miristoílico de ABL.

### Farmacodinámica

*In vitro*, el asciminib inhibe la actividad tirosina-cinasa de ABL1 con unos valores medios de  $CI_{50}$  por debajo de 3 nanomolar. En células cancerosas derivadas de pacientes, el asciminib inhibe específicamente la proliferación de las células portadoras de BCR-ABL1 con unos valores de  $CI_{50}$  comprendidos entre 1 y 25 nanomolar. En células que expresan la forma normal de BCR-ABL1 el asciminib inhibe la proliferación celular con unos valores medios de  $CI_{50}$  de  $0,61 \pm 0,21$  nanomolar.

En modelos murinos de xenoinjerto de LMC, el asciminib inhibió de forma dependiente de la dosis la proliferación de tumores portadores de la forma normal de BCR-ABL1 observándose regresión tumoral con dosis por encima de 7,5 mg/kg dos veces al día.

### Electrofisiología cardíaca

El tratamiento con Scemblix se asocia a una prolongación del intervalo QT relacionada con la exposición. La correlación entre la concentración de asciminib y la máxima variación media estimada con respecto al inicio del intervalo QT corregido según la fórmula de Fridericia ( $\Delta QTcF$ ) se evaluó en 239 pacientes con LMC Ph+ o leucemia linfoblástica aguda (LLA) Ph+ que recibieron Scemblix en dosis comprendidas entre 10 y 280 mg dos veces al día y entre 80 y 200 mg una vez al día. La  $\Delta QTcF$  media estimada fue de 3,35 ms (límite superior del IC del 90%: 4,43 ms) para la administración de Scemblix en dosis de 40 mg dos veces al día, de 3,64 ms (límite superior del IC del 90%: 4,68 ms) para la dosis de 80 mg una vez al día.

### Farmacocinética

#### Absorción

El asciminib se absorbe rápidamente, alcanzándose la mediana de la concentración plasmática máxima ( $T_{m\acute{a}x}$ ) entre 2 y 3 horas después de la administración oral, con independencia de la dosis. La media geométrica (geoCV%) de la  $C_{m\acute{a}x}$  en el estado de equilibrio es de 1781 ng/ml (23%) y 793 ng/ml (49%) tras la administración de Scemblix en dosis de 80 mg una vez al día y 40 mg dos veces al día, respectivamente. La media geométrica (geoCV%) del  $AUC_{\tau}$  es de 5262 ng·h/ml (48%) tras la administración de Scemblix a la dosis de 40 mg dos veces al día.



Los modelos FCF predicen que la absorción del asciminib es de aproximadamente el 100%, mientras que su biodisponibilidad es de alrededor del 73%.

La biodisponibilidad del asciminib podría verse reducida por la administración conjunta por vía oral de medicamentos que contienen hidroxipropil- $\beta$ -ciclodextrina como excipiente. La administración conjunta de dosis múltiples de itraconazol con un total de 8 g de hidroxipropil- $\beta$ -ciclodextrina por dosis y una dosis de 40 mg de asciminib redujo el AUC<sub>0-∞</sub> de asciminib en un 40,2% en sujetos sanos.

### **Efecto de los alimentos**

La ingesta de alimentos reduce la biodisponibilidad del asciminib, de manera que una comida rica en grasas tiene mayor efecto sobre la farmacocinética del asciminib que una comida baja en grasas. El AUC de asciminib se ve reducida en un 62,3% con una comida rica en grasas y en un 30% con una comida baja en grasas en comparación con la ingesta en ayunas, con independencia de la dosis (véanse los apartados 4 Posología y administración y 8 Interacciones).

### **Distribución**

El volumen de distribución aparente del asciminib en el estado de equilibrio es de 111 l, de acuerdo con el análisis de farmacocinética poblacional. El asciminib se distribuye principalmente en el plasma, con un cociente sangre/plasma medio de 0,58, independientemente de la dosis. El asciminib presenta un índice de unión a proteínas plasmáticas del 97,3%, independientemente de la dosis.

### **Biotransformación y metabolismo**

El asciminib se metaboliza principalmente a través de oxidación mediada por el CYP3A4 (36%) y glucuronidación mediada por UGT2B7 y UGT2B17 (13,3% y 7,8%, respectivamente). Los modelos FCF predicen que la secreción biliar de asciminib a través de la BCRP explica el 31,1% de su depuración sistémica total. El asciminib es el principal componente circulante en el plasma (92,7% de la dosis administrada).

### **Eliminación**

El asciminib se elimina principalmente por excreción fecal, con una contribución secundaria de la vía renal. El 80% y el 11% de la dosis de asciminib se recuperaron en las heces y en la orina de sujetos sanos, respectivamente, tras la administración oral de una sola dosis de 80 mg de asciminib marcado con [<sup>14</sup>C]. La eliminación fecal de asciminib inalterado corresponde al 56,7% de la dosis administrada.

La depuración total (Cl/F) después de la administración oral de asciminib es de 6,31 l/h, de acuerdo con el análisis de farmacocinética poblacional. La vida media de eliminación terminal (t<sub>1/2</sub>) del asciminib se sitúa entre 7 y 15 horas.

### **Linealidad o alinealidad**

El asciminib muestra un ligero aumento desproporcionado de la exposición en el estado de equilibrio (AUC y C<sub>máx</sub>) en el intervalo de dosis de 10 a 200 mg administrados una o dos veces al día.

La media geométrica del índice de acumulación promedio es de aproximadamente el doble, independientemente de la dosis. Las condiciones del estado de equilibrio se alcanzan a los 3 días con la dosis de 40 mg dos veces al día.

## **Evaluación *in vitro* de la capacidad de interacción del fármaco**

### ***Enzimas CYP450 y UGT***

*In vitro*, el asciminib inhibe de forma reversible las enzimas CYP3A4/5, CYP2C9 y la UGT1A1 a las concentraciones plasmáticas alcanzadas con una dosis diaria total de 80 mg.

### ***Transportadores***

El asciminib es un sustrato de la BCRP y la gpP. El asciminib inhibe la BCRP, la gpP, el OATP1B1, el OATP1B3 y el OCT1 con unos valores de  $K_i$  de 24,3, 21,7, 2,46, 1,92 y 3,41 micromolar, respectivamente. Los modelos FCF indican que el asciminib aumenta la exposición a los sustratos del OATP1B y la BCRP (véase el apartado 8 Interacciones). De acuerdo con los modelos FCF, no se espera ninguna interacción de interés clínico para los sustratos de la gpP.

### ***Múltiples vías***

El asciminib se metaboliza por varias vías, entre las que se incluyen la del CYP3A4, la de la UGT2B7 y UGT2B17, así como por la secreción biliar mediada por el transportador BCRP.

Los medicamentos que inhiben o inducen múltiples vías podrían alterar la exposición a Scemblix.

El asciminib inhibe varias vías, como la de CYP3A4, CYP2C9, OATP1B y la de la gpP y la BCRP. Scemblix puede aumentar la exposición a los medicamentos que son sustratos de estas vías (véase el apartado 8 Interacciones).

## **Poblaciones especiales**

### **Pacientes geriátricos (mayores de 65 años)**

En el estudio ASCSEMBL, 44 de los 233 pacientes (18,9%) tenían 65 años o más, y 6 (2,6%) tenían 75 años o más.

En conjunto, no se observaron diferencias en la seguridad o la eficacia de Scemblix entre los pacientes mayores de 65 años y los pacientes más jóvenes. El número de pacientes de 75 años o más es insuficiente para evaluar si existen diferencias en la seguridad o la eficacia.

### **Sexo biológico, raza y peso corporal**

La exposición sistémica al asciminib no se ve afectada por el sexo biológico, la raza ni el peso corporal en un grado clínicamente trascendente.

### **Disfunción renal**

Se ha llevado a cabo un estudio específico sobre disfunción renal en el que participaron 6 sujetos con función renal normal (filtración glomerular absoluta [FGa]  $\geq 90$  ml/min) y 8 sujetos con disfunción renal severa que no precisaban diálisis (FGa de 15 a  $< 30$  ml/min). El  $AUC_{0-\infty}$  y la

$C_{\text{máx}}$  del asciminib se ven aumentadas en un 56% y un 8%, respectivamente, en los sujetos con disfunción renal severa en comparación con los sujetos con función renal normal tras la administración por vía oral de una dosis única de 40 mg de Scemblix (véase el apartado 4 Posología y administración).

Los modelos de farmacocinética poblacional indican un aumento del 11,5% de la mediana del  $AUC_{0-24h}$  del asciminib en el estado de equilibrio en los sujetos con disfunción renal de leve a moderada, en comparación con los sujetos con función renal normal.

### **Disfunción hepática**

Se ha llevado a cabo un estudio específico sobre disfunción hepática en el que participaron 8 sujetos con función hepática normal, 8 sujetos con disfunción hepática leve (puntuación de Child-Pugh A de 5 a 6), 8 sujetos con disfunción hepática moderada (puntuación de Child-Pugh B de 7 a 9) y 8 sujetos con disfunción hepática severa (puntuación de Child-Pugh C de 10 a 15). El  $AUC_{0-\infty}$  del asciminib se ve aumentada en un 22%, un 3% y un 66% en los sujetos con disfunción hepática leve, moderada y severa, respectivamente, en comparación con los sujetos con función hepática normal tras la administración por vía oral de una dosis única de 40 mg de Scemblix (véase el apartado 4 Posología y administración).

## **12 Estudios clínicos**

### **LMC Ph+ FC**

La eficacia clínica y la seguridad de Scemblix en el tratamiento de pacientes con leucemia mieloide crónica con positividad para el cromosoma Filadelfia (LMC Ph+) en fase crónica (FC) previamente tratados con dos o más inhibidores de tirosina-cinasas se demostró en el estudio ASCEMBL de fase III multicéntrico, aleatorizado, comparativo con tratamiento activo y sin enmascaramiento.

En este estudio, un total de 233 pacientes fueron aleatorizados en una proporción 2:1 y estratificados en función de su estado inicial en cuanto a la respuesta citogenética significativa (RCS) para recibir 40 mg de Scemblix dos veces al día ( $N = 157$ ) o 500 mg de bosutinib una vez al día ( $N = 76$ ). Los pacientes continuaron el tratamiento hasta la aparición de toxicidad inaceptable o el fracaso del tratamiento.

El 51,5% de los pacientes con LMC Ph+ FC eran mujeres y el 48,5% eran hombres; la mediana de edad era de 52 años (intervalo: de 19 a 83 años). De los 233 pacientes, el 18,9% tenían 65 años o más, mientras que el 2,6% tenían 75 años o más. Los pacientes eran de raza blanca (74,7%), asiáticos (14,2%) o de raza negra (4,3%). De los 233 pacientes, el 80,7% y el 18% tenían un estado funcional del ECOG (Grupo Oncológico Cooperativo del Este) de 0 o 1, respectivamente. El 48,1%, el 31,3%, el 14,6% y el 6% de los pacientes habían recibido 2, 3, 4 y 5 o más líneas previas de tratamiento con ITC, respectivamente. La mediana de duración del tratamiento fue de 103 semanas (intervalo: de 0,1 a 201 semanas) en los pacientes que recibieron Scemblix y de 31 semanas (intervalo: de 1 a 188 semanas) en los que recibieron bosutinib.

El criterio de valoración principal del estudio fue la tasa de respuesta molecular significativa (RMS) a las 24 semanas y el criterio de valoración secundario clave fue la tasa de RMS a las

96 semanas. La RMS se define como una proporción de BCR-ABL1  $\leq 0,1\%$  en la escala internacional (EI). Los criterios de valoración secundarios fueron la respuesta citogenética completa (RCC) a las 24 y 96 semanas, definida como la ausencia de metafases en la médula ósea tras examinar un mínimo de 20 metafases.

Los principales resultados de eficacia del estudio ASCEMBL se resumen en la tabla 12-1.

**Tabla 12-1 Resultados de eficacia en pacientes con LMC Ph+ FC previamente tratados con dos o más inhibidores de tirosina-cinasas (ASCSEMBL)**

|                                              | <b>Scemblix 40 mg<br/>dos veces al día</b>           | <b>Bosutinib<br/>500 mg<br/>una vez al día</b>       | <b>Diferencia<br/>(IC del 95%)</b>   | <b>Valor de p</b>    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Tasa de RMS, % (IC del 95%) a las 24 semanas | <b>N = 157</b><br>25,48<br>(18,87; 33,04)            | <b>N = 76</b><br>13,16<br>(6,49; 22,87)              | 12,24 <sup>1</sup><br>(2,19; 22,30)  | 0,029 <sup>2</sup>   |
| Tasa de RMS, % (IC del 95%) a las 96 semanas | 37,58<br>(29,99; 45,65)                              | 15,79<br>(8,43; 25,96)                               | 21,74 <sup>1</sup><br>(10,53; 32,95) | 0,001 <sup>2</sup>   |
| Tasa de RCC, % (IC del 95%) a las 24 semanas | <b>N = 103<sup>3</sup></b><br>40,78<br>(31,20; 50,9) | <b>N = 62<sup>3</sup></b><br>24,19<br>(14,22; 36,74) | 17,3 <sup>1</sup><br>(3,62; 30,99)   | 0,019 <sup>2,4</sup> |
| Tasa de RCC, % (IC del 95%) a las 96 semanas | 39,81<br>(30,29; 49,92)                              | 16,13<br>(8,02; 27,67)                               | 23,87 <sup>1</sup><br>(10,3; 37,43)  | 0,001 <sup>2,4</sup> |

<sup>1</sup>Tras realizar el ajuste en función de la situación inicial respecto a la respuesta citogenética significativa.

<sup>2</sup>Prueba bilateral de Cochran-Mantel-Haenszel estratificada en función de la situación inicial respecto a la respuesta citogenética significativa.

<sup>3</sup>El análisis de la RCC se basó en los pacientes que no se encontraban en RCC al inicio.

<sup>4</sup>Valor de p nominal.

La tasa de RMS prevista a las 24 semanas para la dosis de 80 mg de Scemblix una vez al día es comparable a la tasa de RMS a las 24 semanas observada en el estudio ASCSEMBL con la dosis de 40 mg de Scemblix dos veces al día, de acuerdo con el análisis de exposición y respuesta.

En ASCSEMBL, el 12,7% de los pacientes tratados con Scemblix y el 13,2% de los pacientes que recibieron bosutinib presentaban una o más mutaciones de BCR-ABL1 detectadas al inicio. Se observó una RMS a las 24 semanas en el 35,3% y el 24,8% de los pacientes con y sin mutación de BCR-ABL1 al inicio, respectivamente, que recibieron Scemblix. Se observó una RMS a las 24 semanas en el 25% y el 11,1% de los pacientes que recibieron bosutinib con y sin la mutación al inicio, respectivamente. La tasa de RMS a las 24 semanas en los pacientes en los que el tratamiento aleatorizado representaba la tercera, cuarta y quinta línea o posterior de ITC fue del 29,3%, el 25% y el 16,1% en los pacientes tratados con Scemblix y del 20%, el 13,8% y el 0% en los pacientes que recibieron bosutinib, respectivamente.

La tasa de RMS a las 48 semanas fue del 29,3% (IC del 95%: 22,32; 37,08) en los pacientes que recibieron Scemblix y del 13,2% (IC del 95%: 6,49; 22,87) en los pacientes que recibieron bosutinib.

La estimación de Kaplan-Meier de la proporción de pacientes que recibieron Scemblix y mantuvieron una RMS durante al menos 72 semanas fue del 96,7% (IC del 95%: 87,4; 99,2).

### **Pacientes con LMC Ph+ FC portadores de la mutación T315I**

La eficacia clínica y la seguridad de Scemblix en el tratamiento de pacientes con LMC Ph+ FC portadores de la mutación T315I se evaluó en el estudio X2101 de fase I multicéntrico y sin enmascaramiento, el primero en seres humanos.

En este estudio, un total de 185 pacientes con LMC Ph+ FC sin ( $N = 115$ ) o con ( $N = 70$ ) la mutación T315I recibieron Scemblix en dosis comprendidas entre 10 y 200 mg dos veces al día o entre 80 y 200 mg una vez al día. De ellos, 48 pacientes con LMC Ph+ FC portadores de la mutación T315I recibieron Scemblix a la dosis de 200 mg dos veces al día. Los pacientes continuaron el tratamiento hasta la aparición de toxicidad inaceptable o el fracaso del tratamiento.

El 77,1% de los pacientes con LMC Ph+ FC portadores de la mutación T315I que recibieron Scemblix a la dosis de 200 mg dos veces al día eran hombres y el 22,9% eran mujeres, con una mediana de edad de 56,5 años (intervalo: de 26 a 86 años). De estos 48 pacientes, el 33,3% tenían 65 años o más, y el 8,3% tenían 75 años o más. Los pacientes eran de raza blanca (47,9%), asiáticos (25%) o de raza negra (2,1%). El 75% y el 25% de los pacientes presentaban un estado funcional del ECOG de 0 o 1, respectivamente. El 16,7%, el 31,3%, el 35,4%, el 14,6% y el 2,1% de los pacientes habían recibido 1, 2, 3, 4 y 5 o más líneas previas de tratamiento con ITC, respectivamente. La mediana de duración del tratamiento fue de 108 semanas (intervalo: de 2 a 215 semanas).

El 42,2% de los pacientes evaluables ( $N = 45$ ) tratados con Scemblix alcanzaron una RMS a las 24 semanas (IC del 95%: 27,7; 57,8%).

## **13 Datos sobre toxicidad preclínica**

El asciminib ha sido objeto de estudios de seguridad farmacológica, toxicidad tras dosis repetidas, genotoxicidad, toxicidad para la función reproductora y fototoxicidad.

### **Seguridad farmacológica**

En los estudios de seguridad farmacológica, el asciminib no tuvo ningún efecto en el sistema nervioso central ni en el aparato respiratorio de las ratas con dosis de hasta 600 mg/kg/d.

En un estudio *in vitro*, el asciminib inhibió los canales iónicos codificados por el gen humano relacionado con el gen *eag* (*éter a gogó*) (*hERG*) con una  $CI_{50}$  de 11,4 micromolar. Este valor se traduce en un margen de seguridad clínica de al menos 200 veces o 100 veces mayor en comparación con la  $C_{máx}$  de asciminib libre en pacientes que reciben las dosis de 40 mg dos veces al día u 80 mg una vez al día, respectivamente.

Se observaron efectos cardiovasculares moderados (frecuencia cardíaca aumentada, presión arterial sistólica disminuida, presión arterial media disminuida y presión del pulso arterial disminuida) en estudios *in vivo* de seguridad cardíaca en perros. No se observó ninguna prolongación del QTc en perros con la exposición máxima a asciminib libre, correspondiente a 6,3 micromolar.

### **Toxicidad tras dosis repetidas**

En los estudios de toxicidad tras dosis repetidas se identificaron el páncreas, el hígado, el sistema hematopoyético, las glándulas suprarrenales y el tubo digestivo como los órganos de actuación farmacológica del asciminib.

Se observaron efectos pancreáticos (amilasa y lipasa séricas elevadas, lesiones de las células acinares) en perros con valores de exposición (AUC) inferiores a los alcanzados en los pacientes que recibieron 40 mg dos veces al día u 80 mg una vez al día. Se observó una tendencia hacia la recuperación.

Se observaron elevaciones de las enzimas hepáticas o la bilirrubina en ratas, perros y macacos. Se observaron cambios histopatológicos hepáticos (hipertrofia de los hepatocitos centrolobulillares, ligera hiperplasia de las vías biliares, aumento de la necrosis de hepatocitos individuales e hipertrofia hepatocelular difusa) en ratas y macacos. Estos cambios se produjeron con valores de exposición (AUC) equivalentes (en las ratas) o entre 8 y 18 veces superiores (en los perros y macacos) a los alcanzados en los pacientes que recibieron 40 mg dos veces al día u 80 mg una vez al día. Estos cambios fueron totalmente reversibles.

Los efectos observados en el sistema hematopoyético (reducción de la masa eritrocitaria, aumento del pigmento en el bazo o la médula ósea y aumento de reticulocitos) fueron coherentes con una anemia hemolítica leve, regenerativa y extravascular en todas las especies. Estos cambios se produjeron con valores de exposición (AUC) equivalentes (en las ratas) o entre 10 y 14 veces superiores (en los perros y macacos) a los alcanzados en los pacientes que recibieron 40 mg dos veces al día u 80 mg una vez al día. Estos cambios fueron totalmente reversibles.

Se observó un grado mínimo de hipertrofia o hiperplasia de la mucosa (aumento del grosor de la mucosa con alargamiento frecuente de las vellosidades) en el duodeno de las ratas con valores de exposición (AUC) 30 o 22 veces mayores que los alcanzados en los pacientes que recibieron 40 mg dos veces al día o 80 mg una vez al día, respectivamente. Este cambio fue totalmente reversible.

Se observó un grado mínimo o leve de hipertrofia de las glándulas suprarrenales y una disminución entre leve y moderada de la vacuolización en la zona fascicular con valores de exposición (AUC) equivalentes (en los macacos) o entre 13 y 19 veces mayores (en las ratas) a los alcanzados en los pacientes que recibieron 40 mg dos veces al día u 80 mg una vez al día, respectivamente. Estos cambios fueron totalmente reversibles.

### **Carcinogenia y mutagenia**

El asciminib carece de potencial mutágeno, clastógeno o aneugénico *in vitro* o *in vivo*.

En un estudio de carcinogenia de 2 años de duración en ratas, no se observaron signos neoplásicos o hiperplásicos relacionados con el asciminib en machos o hembras con ningún nivel de dosis. Las exposiciones al asciminib, según el AUC, en ratas con la dosis más alta fueron por lo general 8 o 5 veces mayores que las alcanzadas en pacientes con la dosis de 40 mg dos veces al día o de 80 mg una vez al día, respectivamente.

### **Toxicidad para la función reproductora**

Para obtener información sobre la toxicidad para la función reproductora, véase el apartado 9 Embarazo, lactancia, mujeres y varones con capacidad de procrear.

### **Fototoxicidad**

En ratones, se han observado efectos fototóxicos dependientes de la dosis de asciminib a partir de 200 mg/kg/d. Con la NOAEL de 60 mg/kg/d, la exposición basada en la  $C_{\text{máx}}$  en el plasma fue 15 o 6 veces mayor que la exposición en pacientes que recibieron 40 mg dos veces al día u 80 mg una vez al día, respectivamente.

## **14 Información farmacéutica**

### **Incompatibilidades**

No procede.

### **Precauciones especiales de conservación**

No conservar a temperatura superior a 25 °C.

Conservar en el envase original protegido de la humedad.

Scemblix debe mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.

La información puede diferir en algunos países.